

فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

أ. م . د / سهام علي عبد الحميد

أستاذ الصحة النفسية المساعد

بكلية التربية - جامعة حلوان

ملخص الدراسة :

هدف الدراسة :

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على الفروق بين الفتيات المدخنات والفتيات غير المدخنات في التوافق النفسي وتقدير الذات مع التدخل لمواجهة سلوك التدخين بالإرشاد النفسي القائم على الإرشاد الديني السلوكي .

أدوات الدراسة :

١- مقياس التوافق النفسي (إعداد الباحثة) .

٢- مقياس تقدير الذات (إعداد هيلموث وأخرون *Helmoth et al* تعریب عادل الله (١٩٩١).

٣- قائمة دراسة الحالة (إعداد الباحثة) .

٤- قائمة تقدير معدل التدخين (إعداد الباحثة) .

٥- مقياس أسباب التدخين (إعداد فوقيه حسن ونجوى شعبان (١٩٩٥) .

٦- برنامج إرشاد ديني وسلوكي لمواجهة التدخين (إعداد وتطبيق الباحثة) .

العينة :

أجريت الدراسة الحالية على ٧٧٢ فتاة في مرحلة المراهقة من تتراوح أعمارهن بين ١٨ - ٢٢ سنة مقسمة بالتساوي إلى ٣٦ فتاة مدخنة و ٣٦ فتاة غير مدخنة للمقارنة بين المجموعتان في تقدير الذات والتوافق النفسي ، وتم حصر شروط ومواصفات العينة كما يلي :

١- الإقصار على الفتيات المدخنات للترجيلة والسجائر وإستبعاد الحالات التي تفضل تعاطي مواد مخدرة أخرى مع الترجيلة والسجائر لأنها دخلت في درجات الإدمان .

٢- الإقصار على الفتيات المسلمات فقط لأن البرنامج المستخدم في الدراسة قائم على الإرشاد الديني مع الإرشاد السلوكي .

فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

تم سحب عينة الدراسة الأساسية من الفتيات المدخنات وعددهن ٢٠ فتاة مقسمة إلى مجموعتين متساويتين كل منهن ١٠ فتيات إحداهن مجموعة ضابطة والأخرى مجموعة تجريبية

النتائج :

أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج الإرشادي القائم على الإرشاد الديني والسلوكي على انخفاض معدل التدخين تدريجياً حتى أفلغ أفراد العينة التجريبية تماماً أثناء جلسات البرنامج وأتضح ذلك من تطبيق قائمة تغير معدل التدخين قبل وأثناء وبعد البرنامج الإرشادي ومن الممكن الاستفادة من هذا البرنامج بتطبيقه على الشباب من الجنسين ولتمكن من الحد من هذا السلوك الضار جداً بصحة الشباب في جميع الأعمار .

فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

أ. م . د / سهام علي عبد الحميد

أستاذ الصحة النفسية المساعد

بكلية التربية - جامعة جلوان

مشكلة الدراسة :

لا شك في الفتاة المصرية اليوم هي أم في المستقبل القريب ، وسوف يتربى وينشأ على يديها أطفال يكونوا شباب مصر وقادتها فيما بعد ، ولذا علينا الاهتمام بالفتاة في جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية أيضاً .

قد لاحظنا في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة التدخين بين الفتيات في التوادي والمقاهي ومتاجر الخدمات المتكاملة المعروفة باسم المول *Mall* وهذا ما يدق أجراس علي مسامعنا ويستدعى انتباها ، حيث أن هذا السلوك السيء يشكل خطراً على صحة جيل كامل من الفتيات ومن الأخطر أن يتوارثه الأجيال القادمة مما يؤثر على المجتمع بأكمله .

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مليوناً ونصف يموتون سنوياً بسبب التدخين ، وأن نسبة المدخنين في ارتفاع كل عام ، ويعتبر التدخين من السلوكيات الضارة بصحة الفرد بصفة عامة ويزيد الضرر بصفة خاصة إذا كان المدخن في سن مبكرة ، حيث نجد أن هناك تزايد في عدد المدخنين من الفتيات وفي شرائح عمرية جديدة ، وصغار السن في مرحلة الشباب .

وباسم الحرية صار بعض الأولاد والبنات يدخنون السجائر عندما تواجههم الأزمات والمشاكل أو في أوقات الراحة والمناسبات ، فيكون التدخين بمثابة المسرى عن همومهم والمضيئ للوقت .

ويعتبر التدخين من السلوكيات الضارة بصحة الفرد خاصة إذا كان المدخن في سن مبكرة ، حيث أكدت نتائج العديد من الدراسات أن الأفراد المدخنين هم أكثر الأفراد عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسى وإختلال وظائف الرئتين وأمراض القلب والسرطان .

وأكّدت هذه النتائج إحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث أوضحت أن ٣٠٪ من حالات الإصابة بالسرطان ترجع إلى التدخين ، وأن ٢١٪ من حالات الوفاة بالذبحة الصدرية سببها التدخين ، وقد أعلنت جمعية أمراض القلب الأمريكية أن نسبة الوفيات من أمراض القلب تزيد عن ٥٥٪ من المدخنين ، كما أن تدخين السجائر يؤدي إلى زيادة هائلة في ضغط الدم .

فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

وتأسياً على ماضٍ تتبّلور الدراسة في التساؤلات التالية :

١- ما هي الفروق بين الفتيات المدخنات وغير المدخنات في التوافق النفسي وتقدير الذات

٢- ما مدى فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لدى المدخنات في مواجهة سلوك التدخين ؟

أهمية الدراسة :

تهتم هذه الدراسة بالفتيات المراهقات المدخنات ، حيث تشكّل هذه الفئة خطورة على البيئة المحيطة بين كثافة سنّة لغيرهن من لافتات الراقي لاتدخن ، مع مواجهة تلك المشكلة بالإرشاد النفسي حتى لا تنتشر تلك الظاهرة السيئة لأقرانهن غير المدخنات وتتوارث لأجيال أخرى .

كما تسهم الدراسة في توضيح الفروق بين الفتيات المدخنات وغير المدخنات في التوافق النفسي وتقدير الذات ، وأيضاً تتضح أهمية تلك الدراسة من الناحية النظرية لملامحة الباحثة ندرة الدراسات العربية التي إهتمت بالفتيات المراهقات المدخنات مثل دراسة ماجي وليم ١٩٨٤ حول الدوافع النفسية والإجتماعية التي تكمّن وراء ظاهرة التدخين عند المراهقات والمرأهقات ، ودراسة فريال على سنة ١٩٩٩ التي تناولت فاعلية إكتساب الإتجاهات الإيجابية في تنمية الكفاءة الذاتية نحو الوقاية من السلوك الضار (التدخين / الكحول / الأدوية النفسية / المخدرات) للذكور والإثاث ، في حين تناولت الدراسات الأجنبية الحديثة ظاهرة التدخين وإهتممت بدراساتها والتدخل لحدّ من تلك الظاهرة مثل دراسات Cepeda , B. A . 2004 , Polanska , K 2004 , Grange , G. 2005 and Bottroff, J. I. 2006 التي إهتمت بارتباط العمل بتدخين الأم وعلاقتها بالإجهاض ، كما اهتمت دراسات لجنبية أخرى بأهمية التدخل بالبرامج العلاجية للإقلاع عن التدخين مثل دراسات Parna , K 2005 , Higgins , S. 2006 and Morasco , B. 2006

وتوضح أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية في أنها بمثابة رسالة توجهها الباحثة إلى المسؤولين والآباء والمربيين للتعرف على دوافع التدخين لدى الفتيات وتجنبها مع زيادة اهتمام الآباء بالأبناء وتنشتهم بصورة أفضل لتجنب تلك السلوكيات السيئة والعادات الخاطئة .

هدف الدراسة :

تهدف الدراسة الحالية إلى التعرّف على الفروق بين الفتيات المدخنات وغير المدخنات في التوافق النفسي وتقدير الذات مع الوقف على مدى فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات المراهقات .

مصطلحات الدراسة :

أولاً : التدخين :

تعددت لتعريفات حول التدخين وجميعها تتفق على أن التدخين هو إستنشاق وإيتلاع الدخان الناتج من إحراق التبغ ، والذي يشمل مخلوطاً من الغازات بالإضافة إلى مواد كيمائية بواسطة السجائر والنرجيلة .

عرف عبد الحميد صفوان التدخين على أنه إستنشاق الدخان الناتج عن إحراق التبغ وإيتلاعه في جوف المدخن (عبد الحميد صفوت ، ١٩٩٢)

أما تعريف التدخين الذي نقصده في بحثنا الحالي هو إيتلاع الدخان الناتج عن إحراق التبغ وخروجه من الأنف باستخدام السجائر أو النرجيلة للفتيات المدخنات في مرحلة المراهقة .

ثانياً : البرنامج الإرشادي :

هو برنامج مخطط يتضمن مجموعة من الخطوات يتم تنسيقها بشكل منظم وعلى فترات يقدرها المتخصص من حيث الزمن والتتابع ، ويستهدف إرشاد المشكلات السلوكية ، وتعديل الإتجاهات وزيادة إبتكار العميل والسير به نحو التغير بعد حل صراعاته وإحداث حالة التوافق لديه ، والبرنامج الإرشادي قد يكون فردياً أو جماعياً على شكل جلسات جماعية .
(مدحت عبد الحميد أبو زيد ٢٠٠٢)

أما برنامج الدراسة الحالية فهو برنامج إرشاد نفسي جماعي قائم على الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات المراهقات المدخنات . حيث يهدف الإرشاد الديني إلى تبني الوعي الديني وإكتساب العادات الصحيحة والسلوكيات المرغوبة ومرافقة أقران الخير والصالحين من خلال الحوار بين الباحثة والفتيات المدخنات حول تفسير الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي حرم سلوك التدخين ، كما هو موضح بالتفصيل في الدراسة .

ويهدف الإرشاد المعرفي للسلوكي إلى عرض نماذج في صورة شرائط فيديو لأسماء الفتيات المدخنات توضح خطورة التدخين على جسم الإنسان بأكمله وذلك لتعديل إتجاهات المدخنات نحو التدخين وإعادة البناء المعرفي لديهن للتعرف على اضراره والإقلال عنه .

الإطار النظري والدراسات السابقة :

وقد مرت طرق استخدام التبغ بمراحل عديدة ، حيث بدأ التدخين في أول صوره باستخدام القليون والذي يسمى أحياناً بالبيبة وفيه يدخن الإنسان التبغ على هيئة أوراق مفرومة بعد تجفيفها

سـفـاعـلـيـةـ الإـرـشـادـ الـدـينـيـ وـالـسـلوـكـيـ لـمـواجهـةـ سـلـوكـ التـدـخـينـ لـدـىـ الـفـتـيـاتـ

والفلسوف ضار بالصحة وخاصة إذا لم ينطف بعد كل استخدام وذلك لترامك كمية من النيكوتين على جدران الفليون والذي يؤدي بدوره إلى التسمم وحدوث غثيان وصداع .
(شعب الغباشي ، ١٩٩٣) .

ومن صور استخدام التبغ استخدامه عن طريق الأنف على هيئة نشوق ، ويشعر المدخن الذي يستنشق النيكوتين الموجود في النشوق بالاسترخاء والانتعاش ، ولكن من أهم أضرار هذه الطريقة أنها تدفع المدخن إلى الإدمان ، وهي تعتبر بداية لاستنشاق المخدرات كالهيرودين مثلاً، كما أنها تحدث التهابات حادة في الأنف ، وقد تؤدي إلى إصابتها بالأمراض الخطيرة .
(جمال موسى ، ١٩٩٣)

ومن أكثر طرق تدخين التبغ شيئاً هي السجائر وتختلف طرق أعداد السجائر من بلد لأخر وببعضها له فلتر والأخر بدون فلتر وعملية تدخين السجائر هو عبارة عن استنشاق ناتج احتراق التبغ يزيد من نسبة النيكوتين في الدم ، وذلك لاحتوائه على النيكوتين بكمية كبيرة بالإضافة إلى الأكرولين المميت ، وتعتبر السجائر أشد وأعظم خطراً من غيرها من وسائل التدخين وذلك لسهولة استنشاق دخانها وسرعة وصوله للرئتين .
(وفاء نصار ، ١٩٩٣)

بالإضافة إلى ما سبق من طرق استخدام التبغ توجد طريقة تدخين التبغ باستخدام الجوزة وهي عبارة عن انتفاخ معدني يحتوي على الماء وزراعة من الغاب ، والدخان المستخدم في الجوزة عبارة عن تبغ وعسل أسود؛ ولذا يطلق عليها اسم المعسل والتدخين بهذه الطريقة يسبب ضرراً كبيراً للمدخنين فقد يؤدي إلى الإصابة بمرض الإنسداد الشعبي المزمن ، وذلك لأن المدخن يحتاج إلى نفس طويل لسحب الدخان من الجوزة مع طلوع الأنابيب المستخدمة فيها
(صلاح فؤاد ، ١٩٩٣) .

وأيضاً ظهرت الزجيلة أو الشيشة وهي تشبه إلى حد كبير الجوزة والفرجيلة تنقل الأمراض بين المدخنين بانتقالها من فم لأخر، وكثيراً في تدخين المخدرات .
(إسماعيل الخطيب ١٩٩٩)

وجدير بالذكر أن الدخان المختلف من احتراق التبغ ليس مادة واحدة بل يضم العديد من المواد الكيميائية التي أغليها مواد سامة ، وتمثل أمم مكونات دخان السجائر في كل من النيكوتين ، القطران ، أول أكسيد الكربون ، وغازات أخرى ، وفيما يلي عرض أضرار كل مادة على حدة .
(Guinn , G., 2006)

١) النيكوتين

يعرف النيكوتين بأنه العنصر الفعال في التبغ ، وهو عبارة عن مادة شبه قلوية سامة جداً ،

والنيكوتين النقي ليس له رائحة ولكن إذا عرض للهواء تصبح له رائحة التبغ ، وتحتلت نسبة النيكوتين في التبغ تبعاً لنوعه ، فهي في التبغ الأسمر ١,٨ ملليجرام ، وتنتروح كميته من ١ - ٢ ملليجرام في السيجارة الواحدة ، ومما يلاحظ على النيكوتين أنه مخدر سام إذا يعتبر من أقوى المبيادات الحشرية ، ويعتبر من أقوى المواد المنبهة في السيجارة ، إذ أن له تأثير سريع في إزالة التوتر ، ويزيد من النبض ويرفع ضغط الدم وانقباض في الأوعية الدموية وإرتفاع نسبة الدهون بالدم . ويتم إمتصاص النيكوتين الناتج من احتراق التبغ داخل الشعب الهوائية للمدخن .
(*Grange , G 2005*)

-٢- القطران :

يعتبر القطران من أهم مكونات التبغ التي تسبب الإصابة بالسرطان وتحتلت كمية هذه المادة في السيجارة تبعاً لطولها ونوع الفلتر ، ومن أضرار القطران أيضاً أنه يتربس في الرئتين مما يعطل عملية تبادل الغازات فيها .
(*Grange , G. 2005 and Guinn , G 2006*)

-٣- أول أكسيد الكربون :

يُنتج عن احتراق التبغ غاز سام هو أول أكسيد الكربون الذي يتراوح من ٢٠-٢٤ مجم في كل سيجارة ، ومن أضراره أنه يهاجم هيموجلوبين الدم ويتحدد معه ليحل محل الأكسجين به مما يؤدي إلى تسمم الجسم والإصابة بالنوبة الصدرية ، لأنّه يساعد على ترسّيب الكوليستروول على جدران شرايين القلب .
(*Cepeda , B. 2004*)

-٤- غازات أخرى :

بالإضافة إلى المكونات السابقة لاحتراق التبغ فإنه يوجد غازات أخرى سامة مثل سيانور الهيدروجين الذي يتتألف الأغشية التي تطبق الجهاز التنفسى وطبقاً لما ذكرته نتائج العديد من الدراسات الأجنبية عن أنها غازات مهيجة تؤدي إلى حدوث التهابات في القصبة الهوائية ، تقلل كمية الهواء التي تدخل الرئة .
(*Parna , K. 2005*)

وتأسساً على ما سبق نجد أن العديد من الدراسات ذكر أن هناك أضرار صحية ونفسية للتدخين مثل الإصابة بالأرق المزمن وأضطرابات النوم وبعض الاضطرابات العصبية للدخنين كارتفاع الأطراف وزيادة إفراز العرق (*Guinn , 2006*) كما يعاني المدخنون من أضطرابات الطعام وفقدان الشهية (*Higgins , 2006*) ويزيد التدخين من أضطرابات الجهاز الهضمي ويظهر أثره في حدوث قرحة المعدة والآثني عشر وبالتالي يؤذى إلى عسر الهضم ، كما للتدخين

سـفـاعـلـيـةـ الإـرـشـادـ الـدـينـيـ وـالـسـلوـكـيـ لـمـواـجـهـةـ سـلـوكـ التـدخـينـ لـدـىـ الـفـتـيـاتـ

آثار ضارة على البلعوم حيث يزيد إرتجاع عسارة المعدة الحمضية في إتجاه البلعوم مما يشعر المدخن بالحموضة . (*Paurna , 2005*)

وتؤثر أيضاً المواد الضارة في دخان السجائر على الفم والأسنان فتسبب تولد الرائحة غير المرغوبة بالإضافة إلى اصفرار الأسنان وتبسوسيها . (*Grange , 2005*)

وفي دراسة *Bishop* عام ٢٠٠٥ حول تأثير التدخين على الجهاز التنفسى على عينة من ٩٧٩ مريض من الجنسين يعانون من التهاب في الشعب الهوائية بسبب التدخين فهو يسبب تدهور للرئتين تدريجياً ، حيث أن استنشاق المواد السامة الموجودة في دخان التبغ يؤدي إلى تغيرات في العشاء المخاطي المبطن للشعب الهوائية مما يحدث بها التهابات ، واتفق العديد من الدراسات على أن التدخين دور فعال في حدوث الإصابة بسرطان الرئة . (*Higgins , 2006 and Guinn 2006*)

كما أظهرت الإحصائيات أن للتدخين آثاره السلبية على القلب ، حيث أوضحت أن ٧٥ % من حالات الوفاة التي تحدث لتوقف القلب فجأة دون أعراض مرضية سابقة تتميز بأن أصحابها من المدخنين (*Heamdn , 2005*) وكذلك فإن الإصابة بجلطة القلب يزداد التعرض لها لدى المدخنين حيث يكون هناك قابلية لتجذب الدم وفي دراسة سحر عبد الرزاق عام (٢٠٠٠) أوضحت أن تدخين سيجارة واحدة يومياً يزيد من نسبة التعرض للإصابة بأمراض شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم .

وركزت دراسة *Copeland* على أن توقف درجة الضرر من التدخين بدلاً من الأكسجين مما يسبب أضراراً خطيرة ، وتتوقف نسبة النيكوتين في الدم على مستوى الاعتماد على النيكوتين ومعدل التدخين في اليوم الواحد وعدد سنوات التدخين . (*Copeland , 2006*)

وتناولت دراسة جيلان محمد عام ٢٠٠٥ الآثار السلبية للتدخين على القدرة الاتهامية لكرات الدم البيضاء ، ومحاجمتها للميكروبات . (جيلان محمد يوسف ، ٢٠٠٥)

كما يسبب التدخين أنواعاً عديدة من السرطان حيث أوضحت إحصائيات المركز الدولي للسرطان بالولايات المتحدة أن ما يقرب من ٣٠ % من حالات الإصابة بالسرطان يتسبب فيها التدخين ، ومن أنواع السرطان التي يسببا التدخين : سرطان الفم ، سرطان البلعوم ، سرطان الحنجرة ، سرطان المثانة ، وسرطان الرئتين . (*Bishop , 2005*)

واتفقت نتائج دراسة عمرو فاروق مع نتائج الدراسات الأجنبية حول الآثار الضارة للتدخين على وظائف الجهاز التنفسى وذلك بمقارنة وظائف الجهاز التنفسى لدى الرياضيين المدخنين وغير

المدخنين ، حيث أسفرت النتائج عن تدهور الحالة الصحية وتأثير وظائف الجهاز التنفسى لدى المدخنين . (عمرو فاروق إسماعيل سلام ، ٢٠٠١)

وأهنت إيمان السيد عبد الهادي عام ٢٠٠١ ، بدراسة تأثير التدخين على مستوى الفيتامينات المضادة للأكسدة والحالة الغذائية للمدخنين على عينة عشوائية تتكون من مائة فرداً من المدخنين ومقارنتهم باقرانهم غير المدخنين وأسفرت النتائج عن وجود اختلاف في متواسطات الفيتامينات المضادة للأكسدة في سيرم الأفراد لصالح غير المدخنين ، واتفقت نتائج دراسة كاميليا عبده لوقا مع الدراسة السابقة حيث ركزت على تأثير التدخين السلبي على مضادات الأكسدة في الأطفال المعندين على الرضاعة الطبيعية ، (كاميليا عبده لوقا ، ٢٠٠٢)

كما يسبب التدخين التهابات شديدة في ملتحمة العين ، وذلك لحساسية العين للمواد السامة بدخان التبغ ، كما يحدث تدهور في قوة الإبصار وضيق في مجال الرؤية البصرية لدى المدخنين بمرور الوقت كما ثفت دراسة Cepeda أضرار التدخين على العين للأفراد المدخنين . (Cepeda , 20004)

وأوضحت دراسة محمود محمد عبد الرحمن أن للتدخين تأثير ضار على الجلد إذ يحدث تغير في لون الجلد ، واصغرار في الأصابع والحساسية الجلدية . (محمود محمد عبد الرحمن ١٩٩٨)

كما كشفت نتائج دراسة Marasco عن التأثير الضار للتدخين على الأنف والحنجرة إذ يعمل على حدوث انكمash في الخلايا ذات الأهداف الموجودة داخل الأنف والمتحركة في الغشاء المخاطي بها ، مما يعرض المدخن للإصابة بالحساسية في الأنف والتهابات في الجيوب الأنفية ، ويزيد من إفرازات الأنف فتتجمع وتترافق بداخلها مما يشجع نمو الميكروبات وحدوث الالتهابات بها ، مما يؤثر بدوره على حدة السمع (Marasco , 2006)

كما أوضحت دراسة أيمن محمود مصطفى أن للتدخين أثر ضار على عضلات الجسم ف يؤدي الاستمرار في التدخين إلى إرتجاء العضلات كما يتبع في بعض القصور بالدورة الدموية في الأطراف مما يسبب الشعور بالآلام في الأرجل أي ان التدخين يتعارض تماماً مع الأداء الرياضي الأفضل ، كما يعرض المدخنين للنهاج والإرهاق عند بذلك أي مجهد مع قصور في وظيفة العضلات مما يفقد المدخن اللياقة الجسمية (أيمن محمود مصطفى ٢٠٠١) واتفقت مع نتائج التأثيرات الوقائية لمضادات الأكسدة ضد التلف الخلوي الناتج عن التدخين .

كما تناولت دراسات عديدة الآثار الضارة للتدخين على الحالة النفسية حيث يؤثر التدخين على الجهاز العصبي ويقلل من التركيز على المدى الطويل مما يسبب اضطراب الذاكرة (Better-off 2006)

كما يعاني العديد من المدخنين من اضطرابات النوم وركزت دراسة محمد عبد الرحمن عام ١٩٩٨ على أضرار التدخين من الجانب الاقتصادي حيث أوضحت الدراسة أن التكافأة المباشرة للتدخين ليست زهيدة بالنسبة لكثير من المدخنين وخاصة أن الأسعار متوجهة دائماً نحو الارتفاع ، كما قد تسبب السيجارة المشتعلة في حرق ثياب المدخن أو المحبيين به كما أن أعقاب السجائر المشتعلة على الأرض قد يسبب حرائق كثيرة مما يسبب للأفراد والدولة خسائر فادحة • بالإضافة إلى أن علاج الأمراض الناتجة عن التدخين يستلزم نفقات هائلة على مستوى الفرد ، ومستوى الدولة التي توفر الأدوية اللازمة لذلك ، فمن واقع الإحصائيات يتزايد سرطان الرئة بصورة ملحوظة في الدول النامية ، وتتكليف علاج هذه الحالات باهظة يضاف إلى ذلك أن مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة في العالم الثالث يزرع فيها التبغ الذي تحكره بعض الشركات الكبرى ، ويحدث ذلك في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم الثالث من نقص في محاصيل الغذاء الرئيسية • (محمد محمد عبد الرحمن ١٩٩٨)

وتناولت دراسات عديدة أثر التدخين على المرأة الحامل سواء كانت مدخنة أم غير مدخنة ويتأثر الجنين نتيجة تدخين الأم تأثيراً سليماً كما في دراسة (Soke) عام ٢٠٠٥ الذي قام بعمل مقارنات بين تأثير التدخين السطبي على الأطفال في رحم الأم لثلاث مجموعات من الأم المدخنة ، وغير المدخنة والأب مدخن وفي حالة الأم والأب مدخني . وكشفت النتائج عن زيادة التأثير السبيئ للتدخين لدى الأجنة داخل رحم الأمهات المدخنات عن غير المدخنات والأب المدخن .
(Loke , 2005)

وأتفقنا مع نتائج دراسة Loke دراسات عديدة ومنها :
(Polanska 2004 , Ma 2005 Guinn 2006)
تعقيب على الدراسات السابقة :

وباستعراض الدراسات والأبحاث المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية وجدت الباحثة أن الدراسات العربية تعرضت للأثار الضارة للتدخين بكل أنواعه المختلفة على أفراد المجتمع في مختلف الأعمار وركزت على الذكور فقط مثل دراسات (وفاء محمود ١٩٩٤ ، ماجد عبد المتعال ١٩٩٧ ، وأيمن محمود ٢٠٠٠) حيث تناولت الآثار السينية للتدخين ومشكلاته لدى المدخنين الذكور ومقارنتهم بأقرانهم غير المدخنين ، وتندر الدراسات التي تناولت المقارنة بين الذكور والإثاث المدخنات من حيث حاجاتهم وللواقع النفسي والإجتماعية التي تكمن وراء سلوك التدخين مثل دراسة ماجي وليم ١٩٨٤ ، ودراسة سامي عبد القوي ١٩٨٦ وباستعراض كل الدراسات العربية السابقة لم نجد بها دراسة واحدة إهتمت بالتدخل بمواجهة المشكلة بالبرامج الإرشادية والعلاجية للحد منها ، ولكن يوجد بعض الدراسات الأجنبية التي إهتمت بذلك مثل دراسة سلسلة المصرية للدراسات النفسية - العدد ٥٩ - المجلد الثامن عشر - أبريل ٢٠٠٨ = (١١٢)

(Pilanska 2004) التي تناولت برنامج للإقلاع عن التدخين لدى المرأة الحامل ودراسة (Aneyard 2006) التي تناولت جلسات للإرشاد السلوكي على ١٢ أسبوع للإقلاع عن التدخين وأيضاً دراسة (Copeland 2006) التي اهتمت على فئات العلاج للإسهام في الإقلاع عن التدخين للإناث المدخنات مع الاهتمام بمعدل التدخين في اليوم الواحد ومستوى الاعتماد على النيكوتين وعدد سنوات التدخين .

وتأسيساً لما سبق فقد تناول البحث التالي الاهتمام بالتدخل لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات المدخنات في مرحلة المراهقة بعمل برنامج إرشاد ديني للحد من التدخين والإقلاع عنه لدى عينة الدراسة التجريبية .

فرضيات الدراسة :

- ١- توجد فروق دالة إحصائية متوسطات درجات المدخنات ومتوسطات درجات أقرانهن غير المدخنات على مقاييس التوافق النفسي المستخدم في الدراسة
- ٢- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الإناث المدخنات ومتوسطات درجات غير المدخنات على مقاييس تقدير الذات المستخدم في الدراسة .
- ٣- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الإناث المدخنات في المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات الإناث المدخنات في المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج الإرشادي على قائمة تقييم معدل التدخين .
- ٤- توجد فروق دالة إحصائية بين متوسطات درجات الإناث المدخنات في المجموعة التجريبية قبل تطبيق البرنامج ومتوسطات درجات نفس أفراد المجموعة التجريبية بعد التطبيق للبرنامج الإرشادي على قائمة تقييم معدل التدخين لصالح التطبيق البعدى .

حدود الدراسة :

تحدد الدراسة الحالية بالعينة والأدوات المستخدمة فيها والأسلوب الإحصائي المتبعة ، وفيما يلي عرض تفصيلي لها .

العينة :

أجريت الدراسة الحالية على ٧٢ فتاة في مرحلة المراهقة من تتراوح أعمارهن بين ١٨ - ٢٢ سنة مقسمة بالتساوي إلى ٣٦ فتاة مدخنة ، ٣٦ فتاة غير مدخنة للمقارنة بين المجموعتين في تقييم الذات والتوافق النفسي ، وتم حصر شروط ومواصفات الدراسة الأساسية كما يلي :

سـيـاعـلـيـة الإـرـشـادـ الدـينـيـ وـالـمـسـلـوكـيـ لـمـواـجـهـةـ سـلـوكـ التـدـخـينـ لـذـىـ الـفـتـيـاتـ

- ١- الإقصار على الفتيات المدخنات للترجيلة والسيجار فقط
- ٢- إستبعاد الحالات التي تفضل تعاطي مواد مخدرة أخرى مع الترجيلة والسيجائر (لأنها دخلت في درجات الإدمان) .
- ٣- الإقصار على الفتياـتـ المسـلمـاتـ فقطـ لأنـ الـبـاحـثـةـ إـسـتـخـدـمـتـ الإـرـشـادـ الدـينـيـ فـيـ الـدـرـاسـةـ .
وـتـمـ سـحـبـ عـيـنةـ الـدـرـاسـةـ الـأـسـاسـيـةـ مـنـ الـفـتـيـاتـ الـمـدـخـنـاتـ وـعـدـدهـ ٢٠ـ فـتـيـةـ مـقـسـمـةـ إـلـىـ مـجـمـوعـتـيـنـ مـتـسـاوـيـنـ كـلـ مـنـهـ ١٠ـ فـتـيـاتـ إـحـدـاهـماـ ضـابـطـةـ وـالـآـخـرـ تـجـرـيـبـيـةـ .
جـمـيعـ أـفـرـادـ الـدـرـاسـةـ إـلـسـطـلـاعـيـةـ وـالـتـجـرـيـبـيـةـ مـنـ الـإـنـاثـ الـمـتـرـدـدـاتـ عـلـىـ كـافـيـرـيـاتـ مـتـاجرـ الـخـدـمـاتـ الـمـكـامـلـةـ يـعـرـفـ بـاـسـمـ السـراـيـ مـوـلـ بـحـائـقـ الـقـبـةـ حـيـثـ يـحـتـوـيـ هـذـاـ الـمـكـانـ عـلـىـ خـمـسـ كـافـيـرـيـاتـ فـيـ كـلـ أـدـوارـ وـبـالـدـورـ الـثـالـثـ إـسـتـرـاحـةـ لـلـزـائـرـيـنـ (ـ إـسـتـخـدـمـتـهاـ الـبـاحـثـةـ فـيـ جـلـسـاتـ الـبـرـنـامـجـ الـإـرـشـادـيـ مـعـ أـفـرـادـ الـمـجـمـوعـةـ الـتـجـرـيـبـيـةـ) .
وـقـدـ إـقـتـصـرـتـ الـبـاحـثـةـ فـيـ درـاسـتـهاـ عـلـىـ الـإـنـاثـ الـمـدـخـنـاتـ فـيـ مـرـحلـةـ الـمـراهـقـةـ لـأـنـهـ ظـاهـرـةـ جـديـدةـ وـغـرـيـبـةـ عـلـىـ الـمـجـتمـعـ الـمـصـرـيـ وـخـطـيرـةـ عـلـىـ أـمـهـاتـ الـمـسـتـقـبـلـ وـمـرـبـيـاتـ الـأـجيـالـ الـقـادـمـةـ مـاـ يـشـكـلـ خـطـورـةـ عـلـىـ النـسـاءـ وـالـأـبـنـاءـ صـحـيـاـ وـنـفـسـيـاـ ،ـ وـلـيـضاـ لـسـهـولـةـ تـعـاملـ الـبـاحـثـةـ معـ الـأـنـثـيـ عـنـ الذـكـرـ الـمـدـخـنـ وـسـهـولـةـ التـدـخـلـ فـيـ الـحـوـارـ وـالـحـدـيـثـ لـاستـكمـالـ الـدـرـاسـةـ وـالـمـقـابـلـةـ فـيـ جـلـسـاتـ الـبـرـنـامـجـ الـإـرـشـادـيـ .

الأدوات :

- ١- مـقـيـاسـ لـلـتوـافـقـ النـفـسيـ (ـ إـعـدـادـ الـبـاحـثـةـ)
- ٢- مـقـيـاسـ تـقـدـيرـ الذـاتـ (ـ إـعـدـادـ هـيلـمـرـشـ وـآـخـرـونـ (ـ تـعـرـيفـ عـادـلـ عـبـدـ اللهـ ١٩٩١ـ)
- ٣- قـائـمـةـ درـاسـةـ الـحـالـةـ (ـ إـعـدـادـ الـبـاحـثـةـ)
- ٤- قـائـمـةـ تـقـدـيرـ مـعـدـلـ التـدـخـينـ (ـ إـعـدـادـ الـبـاحـثـةـ)
- ٥- مـقـيـاسـ أـسـبـابـ التـدـخـينـ (ـ إـعـدـادـ فـيـقـيـةـ حـسـنـ وـنـجـوـيـ شـعـبـانـ ١٩٩٥ـ)
- ٦- بـرـنـامـجـ إـرـشـادـيـ لـمـواـجـهـةـ التـدـخـينـ (ـ إـعـدـادـ الـبـاحـثـةـ)
وـفـيـمـاـ يـلـيـ عـرـضـ لـأـدـوـاتـ الـدـرـاسـةـ بـالـتـفـصـيلـ :

١- مقياس التوافق النفسي (ملحق رقم ١)

أعدت الباحثة مقياس التوافق النفسي للشباب في مرحلة المراهقة مع مراعاة أن تناسب عبارات المقياس الشباب المدخن وغير المدخن ، وصمم المقياس باتباع الخطوات التالية :

(ا) الإطلاع على العديد من المقاييس والاختبارات التي تقيس سمات الشخصية بصفة عامة والتوافق النفسي بصفة خاصة ، والإطلاع على الدراسات التي تناولت سمات وخصائص الشباب في مرحلة المراهقة .

(ب) صياغة عبارات المقياس بصورة محددة وموجزة للتعبير عن أبعاد التوافق النفسي وجوانبه المختلفة ، وإشتمل المقياس على بعدي التوافق الشخصي والتوافق الاجتماعي ، وتم تنقح هذه العبارات وإعادة صياغتها وحذف بعضها والإبقاء على البعض الآخر حتى يستقر المقياس في صورته الأولية متضمناً ٤٤ عبارة .

(ج) تم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعة المختصين وبعد التحكيم تم إعادة صياغة بعض عبارات المقياس ، وحذف ٤ عبارات وأصبح المقياس في صورته النهائية ٤٠ عبارة يتضمن ٢٠ عبارة للبعد الشخصي و ٢٠ عبارة للبعد الاجتماعي .

(د) تم تطبيق المقياس على عينة مكونة من ١٠٠ فتاة من فتيات الجامعة وخارجها من المدخنات وغير المدخنات . وذلك لحساب الثبات بطريقة إعادة الإختبار وطريقة التجزئة النصفية ، وكان معامل ثبات المقياس ٨٨،٠٠ وتم تعين صدق المقياس عن طريق إستطلاع آراء المحكمين وصدق التجانس الداخلي للعبارة ، وذلك بتعيين معامل الإرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية ، وكان معدل معامل الإرتباط يتراوح بين ٥٤،٠٠ ، ٧٨،٠٠ وهي دالة عند مستوى ٠١٠٠ ويحتو المقياس على بعدين هما :

١- بعد التوافق الشخصي ويتضمن جوانب : الاعتماد على النفس والإحساس بالقيمة الذاتية ، والإحساس بالحرية الشخصية والشعور بالانتماء ، والخلو من الميول الإنسانية .

٢- بعد التوافق الاجتماعي ويتضمن جوانب : المعايير الاجتماعية ، علاقات الأسرية ، المهارات الاجتماعية ، والخلو من الميول المضادة للمجتمع والعلاقة بالأقران والبيئة المحلية .

تصحيح المقياس :

المقياس مكون من ٤٠ عبارة ، ويستجاب لكل عبارة بأحد بديلين هما (نعم) أو (لا) وكل إجابة تتوافق مع الإجابة الصحيحة بنعم لم لا يحصل المفحوص على درجة واحدة لتكون مجموع الدرجات الخام ٤٠ درجة يتم حسابها من خلال مفتاح التصحيح .

تم حساب الدرجة المعيارية لكل درجة من الدرجات الخام التي حصل عليها أفراد العينة أشقاء تقنين المقياس بهدف تحديد الدرجة المحددة للتواافق النفسي للشباب والدرجة التي تحدد سوء التوافق عند افراد العينة وعلى ذلك كانت الدرجة ٢٦ فأقل تحدد سوء التوافق النفسي للشباب ، وما يزيد عن درجة ٢٦ يعبر عن التوافق النفسي للشباب .

٢- اختبار تقدير الذات للمراهقين والراشدين (ملحق ٢٠)

إعداد هيلمرتش ، وآخرين ١٩٩١ (Helmreich , Stapp , Errin)

وأعده باللغة العربية عادل عبد الله ١٩٩١ ويتكون هذا الإختبار من ٣٢ عبارة ، أمام كل منها خمسة إختيارات هي : لا تطبق إطلاقاً - لا تطبق كثيراً - تطبق إلى حد ما - تطبق إلى درجة كبيرة - تطبق تماماً .

وعلى المفحوص أن يحدد إنطباق كل عبارة عليه ، وذلك بوضع علامة (✓) أمام العبارة تحت العمود الذي يتفق معه . ويحمل هذا الإختبار اسم (Texas Social Behaviour Inventory TSBI) وتم حساب الدرجة الكلية للمفحوص في هذا الإختبار بجمع الدرجات في الفئات الخمسة للإختبار ، وتتراوح الدرجات ما بين صفر - ١٢٨ ، وتدل الدرجة المرتفعة على تقدير مرتفع للذات ، بينما تدل الدرجة المنخفضة على تقدير منخفض للذات .

تقنين الإختبار :

ثبات الإختبار :

تم حساب الثبات بطريقة إعادة تطبيق الإختبار - والإتساق الداخلي وطريقة التجزئة النصفية ، فكانت معاملات الثبات على التوالى ٠٠,٨٢ ، ٠٠,٨٢ ، ٠٠,٩٧ وقد استخدمت الدراسة الحالية طريقة إعادة تطبيق الإختبار في ثبات المقياس وذلك بتطبيقه على عينة قوامها (١٠٠) مقسمة إلى (٥٠) مدخناً و (٥٠) غير مدخن وكان معامل الثبات ٠٠,٨٣ وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل على صلاحية الإختبار .

صدق الاختبار :

يتم حساب الصدق عن طريق صدق المحكمين والصدق التجريبي فكان معامل الارتباط على التوالي : ٠,٨٤٦ - ٠,٩٧٨ ، أما عن الصدق الذاتي في الدراسة الحالية فكان ٠,٨٤٨

٣- قائمة دراسة الحالة (ملحق ٣) :

أعدت الباحثة هذه القائمة لاستخدامها في إجراء المقابلات الشخصية المقمنة فهي تزودها بمعلومات عن تاريخ حياة المفحوصين الماضية والحاضرة ، لذا قامت الباحثة بالإطلاع على ما يلي :

أ- إستبيان التحليل السلوكي لتاريخ الحالة *B.A.H.Q Behavioural Analysis History* إعداد كاتيلا وآبر *Cautela & Upper Questionnaire* عام ١٩٧٦ .

ب- دليل فحص دراسة الحالة في الإرشاد والعلاج النفسي إعداد حامد زهران ١٩٧٦ .

ج- إستبيان التحليل السلوكي إعداد أحمد متولى ١٩٩٣ .

وقد قامت الباحثة بتعديل وإضافة بعض البنود لتناسب مع عينة الدراسة والمعلومات التي تزيد جمعها عنهم في القائمة ملخصاً :

١- بيانات عامة عن الفرد

٢- أحداث الطفولة والتاريخ الطبي .

٣- العلاقة مع أفراد الأسرة والأقران .

٤- العلاقة مع أفراد الجنس الآخر .

٥- الطموح والأنشطة والعادات .

٦- التاريخ التعليمي للفرد .

٧- الأحلام وإضطرابات النوم .

٨- المخاوف والأفكار السلبية المتصلة بها .

٩- المشكلات السلوكية والإضطرابات النفسية واللزمات الحركية .

٤- قائمة تقدير معدل التدخين : (ملحق ٤)

أعدت الباحثة هذه القائمة لتقدير معدل التدخين لدى الفتيات المدخنات قبل تطبيق البرنامج الإرشادي وبعد التطبيق ، والقائمة تتكون من صفحتان ، حيث تحتوى الصفحة الأولى على بيانات عامة للمفحوص وتعليمات التطبيق والصفحة الثانية تتكون من بعض الأسئلة للتعرف على نوع التدخين ، وعدد المرات في اليوم الواحد وكيفية التدخين وذلك لتقدير معدله لدى المدخنة وقد تم تحكيم القائمة ومراجعتها من الناحية الطبية .

٥- مقياس أسباب التدخين (ملحق ٥)

أعد هذا المقياس فوقية حسن ، نجوى شعبان عام ١٩٩٥ وهو يقيس أسباب التدخين كما يدركها المدخنة وغير المدخن ويتضمن خمسة أبعاد هي : الأسباب النفسية - الأسباب الاجتماعية - الأسباب الشخصية - الأسباب البيولوجية - الأسباب المادية وتدرج تحت كل بعد ١٥ عبارة وبذلك يكون إجمالي عدد العبارات (٧٥ عبارة) حيث وضعت العبارات في صيغة خبرية ويطلب من المفحوص الإجابة على كل عبارة بإختيار إحدى الإجابتين نعم - لا وتحصل الإجابة نعم على درجة واحدة والإجابة لا على صفر ، وبذلك تتراوح درجات البعد الواحد ما بين صفر - ١٥ درجة والمقياس ليس له درجة كلية . وتم حساب ثبات المقياس عن طريق الإحتمال المتولى لمعامل ثبات المفردة وحساب الصدق بطريقة الإرتباط الثاني الأصيل .

٦- البرنامج الإرشادي :

قامت الباحثة بتطبيق برنامج إرشاد نفسي جماعي لمواجهة مشكلة التدخين لدى الفتيات المراهقات وقد اقتصرت عينة الدراسة على الإناث (كما سبق شرح شروع العينة)

الأساس النظري للبرنامج والفتيات الإرشادية المستخدمة :

حرصت الباحثة على أن يكون البرنامج شامل ومتكملاً لمواجهة مشكلة التدخين وإرشاد الفتيات المدخنات لخطورة إنتشار هذه الظاهرة السليمة على صحتهن وصحة المحبيطين بهن ، ولذا أشتمل البرنامج على العديد من الفتيات التي تم انتقاءها من نظريات العديد من الفتيات وإدماجها بشكل تكامل لخدمة أهداف البرنامج فقد أشتمل البرنامج الإرشادي على الإرشاد المعرفي السلوكي والإرشاد الديني .

* راجع القائمة أ.د / يوسف على فريد أستاذ الصحة العامة ووكيل كلية التربية - جامعة حلوان لشئون الطلبة .

وفيما يلي عرض لكل نوع من الإرشاد والهدف من اختياره وخطواته :-

١- الإرشاد المعرفي السلوكي :-

يهدف الإرشاد المعرفي السلوكي إلى تعديل إدراكات المفحوص الخاطئة وأفكاره المشوهة إلى طرق أكثر ملائمة للتفكير تغييرات سلوكية ومعرفية وانفعالية سوية أي إعادة البناء المعرفي للمفحوص الذي يساعد على تغيير سلوكياته مع الآخرين ويتم ذلك من خلال :

- عرض نماذج تفسر أضرار التدخين وأثره السيء على صحة الإنسان
- إتباع إجراءات إعادة البناء المعرفي مع اشتراك أفراد المجموعة التجريبية في تقييم ذاتهم من خلال الحوار مع الباحثة بعد مشاهدة النماذج المعروضة ومشاركتهم في إعادة بنائهم المعرفي واستبصارهن بذواتهن .

٢- الإرشاد الديني : يقوم الإرشاد الديني على أساس أن التقرب إلى الخالق عز وجل يساعد الفرد على التوازن الأنفعالي والسعادة في الدنيا والآخرة والرضا بقضاء الله وقدره والوصول إلى النفس المطمئنة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة التي تخوب الله سبحانه وتعالي ، ولذا فإن الإرشاد الديني يهدف إلى غرس القيم الدينية والمعايير الاجتماعية السوية التي تجعل الفرد إيجابي وفعال ومتواقة مع البيئة المحيطة به ، وتحث الفرد على التعاون وضبط النفس والتلاقي مع المحيطين به ويتم ذلك من خلال :

عدد جلسات البرنامج : استغرق تطبيق البرنامج (١٠) عشرة أسابيع بواقع جلستين أسبوعياً أي بمعدل عشرين جلسة إرشادية مع أفراد المجموعة التجريبية وتتنوعت الجلسات بين الإرشاد المعرفي السلوكي والإرشاد الديني لمساعدة الفتيات على الاتجاه نحو السلوك الصحيح المرغوب اجتماعياً واستغرقت الجلسة بين ٩٠ - ١٢٠ دقيقة أي لا تقل الجلسة عن ساعة ونصف ولا تزيد عن ساعتين .

ويوضح الجدول التالي الجلسات الإرشادية و محتواها والזמן الذي استغرقته كل جلسة .

فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

جدول (١) رقم الجلسة الإرشادية ، ومحتهاها ، والهدف منها ، والزمن الذي استغرقه

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
٩٠ دقيقة (ساعة ونصف الساعة)	تبسيط مناخ من الألفة والمودة بين الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية من الفتيات المدخنات	التعارف بين الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية ببعضهن البعض مع توضيح سرية ما يدور في الجلسات . وعدم إنشاء أسرار بعضهن البعض والتعرف على أهداف الجلسات الإرشادية وقولها للمجموعة	الأولى
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي لإعادة البناء المعرفي لدى الفتيات المدخنات وتعديل السلوك الخاطئ مع إثراز الأثار السينية للتدخين . على القلب والأوعية الدموية	مشاهدة شريط فيديو حول الجهاز الدورى في جسم الإنسان مع التركيز على دور القلب كعضو هام لتنفس الدم في كل خلايا الجسم وتقضي أثر غاز أول أكسيد الكربون الذي يتنق عن احتراق التبغ وهو غاز سام يرسل الكوليستروول على جدران شرايين القلب فيودي إلى النهاية الصدرية وأعراض شرايين القلب وإيقاع ضغط الدم	الثانية
٩٠ دقيقة	إرشاد نفسي ديني لغرس القيم الدينية الصحيحة وإتباع السنة النبوية في اختيار الجليس الصالح واصدقاءه الخير والابتعاد عن أصدقاءسوء	دار الحوار بين الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية حول الأحاديث الشرفية والسلة النبيوية التي دعت إلى النبي عن كل ما هو ضار بالفرد أو المحظوظ به ومن بن هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل السك ونافع الكبير ، فحامل السك إما أن يعطيك ، وإنما أن يتبع منه وإما أن تجد منه ريحًا طيبة ونافع الكبير ، إما أن يحرق ثيابك ، وإنما أن تجد منه ريحًا خبيثة) أخرجه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم	الثالثة

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	لرشاد معرفي سلوكي وتوضيح الآثار السلبية للتدخين على الجهاز التنفسى وذلك يساعد على إعادة البناء المعرفي لدى الفتيات المدخنات ويعطىهن يفكرون جيداً قبل الاتصال على التدخين بكل أنواعه .	مشاهدة شريط فيديو حول الجهاز التنفسى بصفة عامة ومدى تأثير الجهاز التنفسى عند الإنسان المدخن بوجود غازات ضارة من احتراق التبغ مثل سيانور الهيدروجين الذى يختلف الأغشية التي تطبق الجهاز التنفسى ، كما أنها غازات مهيجه وضارة تؤدي إلى حدوث التهابات في القصبة الهوائية ، كما تقلل كمية الهواء التي تدخل الرئتين ، كما يسبب التدخين تدهور الرئتين تدريجياً حيث أن استنشاق المواد السامة الموجودة في دخان التبغ يؤدي إلى تغيرات في الشفاء المخاطي المبطن للشعب الهوائية فيحدث التهابات	الرابعة
٩٠ دقيقة	استكمال الإرشاد المعرفي لإعادة البناء المعرفي لدى الفتيات المدخنات لتعديل سلوكياتهن واتجاهاتهن نحو عملية التدخين	استكمال مشاهدة شريط القيد حول الجهاز التنفسى ومكوناته وأهميته في جسم الإنسان مع التركيز على الضرر تسببه مادة القطران على الرئتين في جسم المدخن والقطران من أهم مكونات التبغ ومن أضراره أنه يترسب في الرئتين مما يعطل عملية تبادل الغازات فيها كما يسبب الاصابة بسرطان الرئتين	الخامسة
٩٠ دقيقة	لرشاد ديني للابتعاد عن يؤذى الجسم ويضره من أي حالات سيئة يؤذى بالضرر إلى الهلاك	دار الحديث بين الباحثة والفتيات المدخنات حول الآية رقم (١٩٥) من سورة البقرة (ولا تلتفوا بليديكم إلى التهلكة) صدق الله العظيم ولقد ثبت أن التدخين يؤذى بالإنسان إلى التهلكة وبصيغة بكثير من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة أو يصعب علاجها مثل المرطان وغيره من الأمراض الأخرى	ال السادسة

فاعلية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
١٢٠ دقيقة ماعتان	إرشاد معرفي سلوكي لتعديل اتجاهات المدخنات نحو التدخين والتعرف على اضراره والإقلاع عنه	مشاهدة شريط فيديو حول تناول الجهاز الهضمي في جسم الإنسان وملحقاته وركزت الباحثة على عرض نتائج دراسات حول أضرار التدخين على معاناة المدخنات بأضطرابات الطعام وفقدان الشهية واضطرابات في الجهاز الهضمي ويظهر أثر ذلك في حدوث قرحة المعدة والأثني عشر كما أن التدخين أشار ضارة على البلعوم حيث يزيد من ارتجاع عسارة المعدة الحمضية في إتجاه البلعوم مما يشعر المدخن بالحموضة	السابعة
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد ديني لتوضيح مسؤولية الفرد نحو المحافظة على صحته وعدم اهملها وكيفية الاستفادة من العلم والمعرفة فيما يفيد الذات والآخرون والمسؤولية في كيفية اتفاق المال فيما ينفع وينفث ولا يضر بالصحة لأن الله الإنسان ميساحب على جسده فيما أباحه وابتدره	دار الحوار بين الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية حول الحديث الشريف (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيمة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفاءه وعن علمه بما فعل به (فيما لتفعل به) وعن ماله من أين اكتسبه وفيما اتفقه وعن جسمه فيما أبلاه) أخرجه الترمذى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابن قيم الجوزية ، ٢٠٠٥) وتؤكد الباحثة بعد الحديث في دور التدخين في التضرر بالعمر والعلم والمال والصحة (الجسم)	الثانية
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي لإعادة البناء المعرفي لدى المدخنات وتعديل الاتجاهات نحو التدخين للإقلاع عنه	مشاهدة شريط فيديو حول العين وتركيبها كعضو الإبصار وأهميتها للإنسان ومدى حساسية العين للتربية أو الدخان الذي تتعرض إليه ولذلك تجد أن التدخين يسبب التهابات شديدة في ملتحمة العين ، وتلك لحساسية العين للمواد المسامة المتراجدة بدخان التبغ ، كما يحدث تدهور الرؤية البصرية لدى المدخنين بمرور الوقت	الثالثة

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
٩٠ دقيقة	إرشاد ديني للابتعاد عن كل ما هو ضار من طعام وشراب	يدور الحوار بين الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية حول الآية رقم (١٥٧) من سورة الاعراف قال الله تعالى في كتابه (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباث) صدق الله العظيم وهذا يتضح أن الله سبحانه وتعالي أحل للإنسان الطعام والشراب الطيب الذي يفيده وحرم عليه كل ما يضره وهذا لمصلحة الفرد أن يطبع ربه سبحانه وتعالي	العاشر
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي لإعادة البناء المعرفي وتعديل إتجاهات المدخنات نحو الإقلاع عن التدخين	مشاهدة شريط فيديو حول تركيب الأنف في جسم الإنسان وأهميتها كعضو لسيع مع أهمية الحفاظ عليها مع توضيح أثر التدخين الضار على الأنف حيث يزيد من إفرازات الأنف فتجمع وتتراكم بداخلها مما يشجع نمو الميكروبات وحدوث الإلتهابات بها ويزيل دوره على حدة السمع	الحادية عشر
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد ديني	حوار الباحثة مع الفتيات حول الحديث (قال رسول الله ﷺ : (من تسمى سما فقتل نفه فيما في يده يتحسأ في نار جهنم خالداً فيها مخلداً أبداً) صدق رسول الله أخرجه البخاري ويتبين من خلال الحديث الشريف أن من يشرب أو يأكل شيئاً مضرراً بنفسه ويؤدي صحته بغضبه ربه سبحانه وتعالي وبعذبه به يوم القيمة وهو في النار خالداً فيها مخلداً أبداً كما ذكر الحديث الشريف .	الثانوية عشر

سقافية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي	<p>مشاهدة شريط فيديو يتناول جسم الإنسان كله وتأثير الألعاب الرياضية وممارسة الرياضة بصفة عامة على عضلات الجسم وقوتها وتوضيح أن للتدخين أثر ضار على عضلات الجسم حيث يؤدي الاستمرار في التدخين إلى إرتخاء العضلات كما يتسبب في إحداث القصور بالدورة الدموية في الأطراف أي أن التدخين يتعارض تماماً مع الأداء الرياضي الأكمل كما يعرض المدخن للهجان ومشاعر ضيق التنفس والإرهاق عند بذل أي مجهود مع قصر نسي وظيفية العضلات مما يفقد المدخن اللياقة الجسمية.</p>	الثالثة عشر
٩٠ دقيقة	إرشاد ديني	<p>دار الحوار بين الباحثة والفتيات المدخنات بالمجموعة التجريبية حول أضرار التدخين من الجانب الاقتصادي حيث تجد أن البكلفة المباشرة للتدخين ليست زهيدة بالنسبة لكثير من المدخنين خاصة أن الأسعار متوجهة دائماً نحو الارتفاع كما أنه مع الاستمرار في التدخين يؤدي إلى سرطان الرئة وتكليف علاج هذه الحالات باهظة وأكيدت الباحثة حديثها مع أفراد عينة البرنامج بالأبيتين ٢٦، ٢٧ من سورة الإسراء حيث قال الله سبحانه وتعالى (ولا تذر بئنرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان زريه كفورا)</p>	الرابعة عشر

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي	مشاهدة شريط فيديو حول تركيب الأنف كعضو هام في منظمة الجهاز التنفسى في جسم الإنسان و مسئول عن حاسة الشم والتنفس مع التركيز على الآثار السمية للposure للدخان والتأثير الضار للتدخين على الأنف إذ يعمل على حدوث إيكماش في الخلايا ذات الأهداب الموجودة داخل الأنف والمتحركة في القشاء المخاطي بها مما يعرض المدخن للإصابة بالحساسية في الأنف والتهاب في الجيوب الأنفية .	الخامسة عشر
٩٠ دقيقة	إرشاد ديني	حوار حول مراعاة المحظيين بنا في المكان الذى نتواجد به ولا يؤذنهم ولاتضرهم بتدخين السليم طبقاً لحديث شريف قال رسول الله ﷺ (من كان يوماً يؤمن بالله واليوم آخر فلا يوذ جاره) أخرجه مسلم	السابعة عشر
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي	مشاهدة شريط فيديو حول الجهاز العصبي في جسم الإنسان مع الآثار الضارة للتدخين على الحالة النفسية لإنسان حيث يوثر التدخين على الجهاز العصبي للدمخن ويؤثر من التركيز على المدى الطويل مما يسبب إضطراب الذاكرة ، كما يعاني العديد من المدخنين من إضطرابات النوم	السابعة عشر

الزمن الذي استغرقه	الهدف منها	محتوى الجلسة	رقم الجلسة
٩٠ دقيقة	إرشاد ديني	حوار بين الباحثة والفتيات المدخنات حول الحديث النبوى الشريف (قال رسول الله ﷺ) (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حيث أوضحت الباحثة لأفراد المجموعة التجريبية أن التدخين وسبب الضرر الشديد والأذى لصحة المدخن نفسه وصحة المحظيين به من أفراد الأسرة نتيجة إنتشار الدخان في الهواء الذي يستنشقه المحظيين به مما يسمى بالتدخين السلبي ويؤدي إلى أذى شديد لهم وضرر بصحتهم كما لو كانوا يدخنون أيضاً منه وبذلك يكون ضرر للفرد وضرار للأخرين المحظيين به	الثانية عشر
١٢٠ دقيقة (ساعتان)	إرشاد معرفي سلوكي	مشاهدة شريط فيديو حول تركيب الجلد في جسم الإنسان وطبقات الجلد والمسام ووظيفته كل جزء ثم أكدت الباحثة على الآثار الضارة للتدخين على الجلد حيث تغير في لون الجلد وإصفاره في الأصابع والحساسية الجلدية	الثالثة عشر
١٢٠ دقيقة	تقييم نهائى البرنامج التأكيد على تقييم الوعي الديني وإكتساب العادات الصحيحة والسلوكيات المرغوبـة ومرافقة أقران الخير والصالحين	<p>جلسة ختام وتضمنت مايلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- حوار مفتوح بين الباحثة وأفراد المجموعة التجريبية حول الآثار الضارة للتدخين بصفة عامة وما يجب علينا عندما نتواجد في مكان واحد مع شخص مدخن بأن نتصحّح بعدم التدخين ونبعد عن المكان الذي به الدخان حتى لا نتعرض للتدخين السلبي ٢- تطبيق قائمة لتقدير البرنامج الإرشادي المستخدم ٣- تطبيق قائمة تقدير معدل التدخين 	العشرون

المراجع

- ١ إسماعيل الخطيب (١٩٩٩)
- ٢ ليمان السيد عبد الهادي (٢٠٠١) ، تأثير التدخين على مستوى الفيتامينات المضادة للأكسدة والحالة الغذائية للمدخنين ، رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد المنزلي ، جامعة حلوان .
- ٣ أيمن محمود مصطفى سالم (٢٠٠١) ، تدخين السجائر وعلاقته بالإصابة بمتلازمة هيلوبكتر بيلوري ، رسالة ماجستير ، كلية الطب ، جامعة عين شمس .
- ٤ جمال موسي (١٩٩٣)
- ٥ جيلان محمد محمود يوسف (٢٠٠٥) ، تأثير التدخين على القدرة الالتهابية لكرات الدم البيضاء ، رسالة ماجستير ، كلية طب الأسنان ، جامعة المنصورة .
- ٦ سامي عبد القوى على (١٩٨٦) ، خصائص الشخصية المرتبطة بتدخين السجائر ، دراسة في الفروق بين الجنسين لدى طلاب الجامعة ، رسالة ماجستير ، كلية
- ٧ سحر عبد الرزاق مسلم (٢٠٠٠) ، اختبار السموم الوراثية في بعض سوائل الجسم في حالات التدخين بأساليب مختلفة ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، قسم علم الحيوان ، جامعة عين شمس .
- ٨ شعيب الغباشي (١٩٩٣)
- ٩ صلاح فؤاد محمد مكاوي (١٩٩٢) ، دراسة في تنظيم الحاجات لدى بعض المدمنين من الشباب ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين شمس .
- ١٠ عبد الحميد صفت (١٩٩٢) .
- ١١ عمرو فاروق (٢٠٠١) .
- ١٢ فوقيه حسن عبد الحميد و نجوى شعبان محمد (١٩٩٥) ، أسباب التدخين كما يدركها المدخن وغير المدخن وعلاقتها بكل من تقدير الذات وموضع الضبط ، مجلة الدراسات النفسية ، أبريل ، مجلد ٥ ، عدد ٢ ، ص ٢٦٥ - ٣٠٠ .
- ١٣ فريال على حمود (١٩٩٩) ، فاعلية إكتساب الإتجاهات الإيجابية في تنمية الكفاءة الذاتية نحو الوقائية بين السلوك الصحي الخطر (التدخين / الكحول / الأدوية النفسية / المخدرات) إعدادي / ثانوي - ذكور / إناث ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة دمشق .

- سقاعية الإرشاد الديني والسلوكي لمواجهة سلوك التدخين لدى الفتيات**
- ١٤ - كاميليا عبده لوقا (٢٠٠٢) ، تأثير التدخين على مضادات الأكسدة في الأطفال المعتادين على الرضاعة الطبيعية ، رسالة ماجستير ، كلية الطب ، جامعة عين شمس .
- ١٥ - مروان سوار (١٩٩٥) ، القرآن الكريم تفسير الإمام الطبرى ، القاهرة : دار الفجر الإسلامي .
- ١٦ - محمد عبد القادر عطا (١٩٩٩) ، زاد المعاد في هدى خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية ، الجزء الأول ، القاهرة : دار التقوى للنشر والتوزيع .
- ١٧ - ماجد عبد المتعال حلمي السيد (١٩٩٧) ، دور التربية في وقاية الطلاب من المخدرات ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة الإسكندرية .
- ١٨ - محمد فؤاد عبد الباقى (١٩٩٠) ، اللؤلؤ والمرجان فيما إنفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ، الجزء الأول ، القاهرة : دار الحديث للطباعة والنشر .
- ١٩ - محمود محمد عبد الرحمن (١٩٩٨) ، أضرار التدخين في أرقام ، مجلة أسيوط للدراسات البيئية ، عدد ١٥ ، ص ٦٥- ٧٧ .
- ٢٠ - ماجي ولين يوسف (١٩٨٤) ، ظاهرة التدخين عند المراهقين والمراءات / الواقع النفسي والإجتماعية ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس .
- ٢١ - وفاء محمود نصار (١٩٩٤) ، التدخين المبكر ومشكلاته لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية ، دراسة نفسية إجتماعية ، رسالة ماجستير ، كلية البنات ، جامعة عين شمس .
- 22- *Bishop , A . (2005) , Immersing Women's intentions to stop smoking following an abnormal cervical smear test result , Preventive Medicine : An International journal Devoted to practice and Theory Vol. 41 (1) Jul , 179 – 185 .*
- 23- *Bottroff , J (2006) , Men's construction of smoking in the context of women's tobacco reduction during pregnancy and postpartum , journal of Social Science and Medicine , Vol. 62 (12) , 3096-3108 .*
- 24- *Cepeda , B (2004) , Meta – Analysis of the Efficacy of Nicotine Replacement Therapy for Smoking Cessation : Differences between Men and Women , Journal of Consulting and clinical psychology , Vol. 72 , V. 4 , Aug , P.712 – 722 .*

- 25- Copeland , A (2006) , *Predicators of pretreatment attrition from smoking cessation among pre – and post menopausal , weight – concerned women . journal of . Eating – Behaviors – Vol7 (lug , 243-25 %*
- 26- Grange , G (2006 . *Risk perception related to smoking among pregnant women . Alcoolologie – et – Addictologie vol23 (1 Speedster) Apr , P.22 S- 25 S.*
- 27- Heamen , M (2005) . *Prevalence and Correlates of smoking during pregnancy : A comparison of aboriginal and non – aboriginal moment in Marti . Birth : Issues in prenatal care vol 32 (4) Dec . 299 – 305*
- 28- Higgins , S (2006) *Smoking status in the weeks of quitting as a predictor of smoking – cessation outcomes in pregnant women Drug and Alcohol Dependence . vol 85 , (2) Nov.,138-144*
- 29- Loke , A . (2005) *A randomized controlled trial of the simple advice given by obstetricians in Guangzhou , china , to non , smoking pregnant women to help their husbands quit smoking patient – Education and counseling .vol59 (4) Oct 31 -37 .*
- 30- Ma. Y (2005) *Predictors of smoking cessation in Pregnancy and Maintenance post partum in low income women. Maternal – and child Health – journal – vol9 (4) Dec.393 -402 .*
- 31- Parna , K (2005) *self – reported and serum cotinine validated smoking in pregnant women in Estonia . Maternal – and child Health – journal – vol9 (4) Dec.385 - 392 .*
- 32- Polansk , K (2004) *Efficacy and Effectiveness of the smoking cessation program for pregnant women .International jouranal of occupational Medicine and Environmental – Health vol 17 (3) , 369 – 377*
- Quinn , G (2006) *Adapting smoking relapse – prevention – Materials for pregnant and postpartum women : Formative Research . Maternal and child – Health – Journal . vol 10 (13) may , 235 – 245 .*

**Effectiveness of Behavioral and religious Counseling programme to
Facing smoking behavior among adolescents girls**

Seham Ali
Associate Professor
Faculty of Education
Helwan University

Introduction: This study aims at analytical and counseling study for smoking behavior among adolescents girls.

Sample : This study current on 72 adolescent girls of different age ranging between 18 – 21 Years.

Tools :

- 1- Case study list (prepared by Researcher).
- 2- Psychological adjustment list (prepared by Researcher).
- 3- Measurement of self assessment (prepared by Helmoth et al translated by Adel Abdullah).
- 4- Assessment of smoking list (prepared by Researcher).
- 5- Measurement of reason smoking list (prepared by Fawkeya Hassan and Nagwa Shaaban 1995).
- 6- Behavioral and Religious counseling programmer (prepared by Researcher).

Results:

The Results of The Study Indicated That There are many social and psychological factors behind the phenomenon of smoking girls in Egypt including the existence of the friend bad girl who serves as a bad example to those who drink normally others socially desirable, and also the absence of a foreign Affairs and control the family of girls, and family rifts, with the rise of high socio – economic level. And the most important reasons not to inculcate religious awareness in the hearts of girls at an early as reveled results, on the effectiveness to the role of religious guidance and counseling in behavioral modification Attitudes about the behavior of smoking and quit it.